

★ BCG 예방접종 후 관리

- 깨끗한 속옷(가능한 면종류)으로 갈아입고 접종부위를 깨끗하게 해줍니다.
- 몽우리에 생긴 고름은 짜지 않습니다. 고름이 많으면 소독된 솜으로 깨끗이 닦아 주고 통풍이 잘 되게 해줍니다.
- 접종부위에 궤양이 생기더라도 약을 바르거나 반창고 등을 붙이지 않도록 합니다.

★ BCG 예방접종 후 나타날 수 있는 이상반응

■ 림프절염(단순비대)

겨드랑이나 목의 림프절 비대가 BCG 예방접종 후 2주~1년 이내에 발생할 수 있으며 통증은 없습니다. 대개 수개월 이내에 자연히 없어지나 1년 이상 남아있을 수도 있으며 특별한 치료는 필요하지 않습니다.

★ 단, 화농성 림프절염으로 진행하거나 2차 세균감염이 발생하는 경우는 치료가 필요합니다.

■ 국소 농양

백신을 피하층에 주입 시 발생하며, 접종부위에 궤양이 생기고 고름이 생길 수 있습니다. 대부분 자연치유 되므로 병변을 깨끗이 닦아 주고, 연고, 항생제, 결핵약 투약, 수술은 필요하지 않습니다.

★ 단, 2차 세균감염이 발생하는 경우는 치료가 필요합니다.

■ 기타 이상반응

접종부위 무통성 궤양이나 켈로이드와 같은 국소 이상반응과 전신 파종성 BCG 감염증, 골수염등이 나타날 수 있습니다.

★ 예방접종 이상반응 국가보상제도 안내

- 정부에서는 1995년부터 예방접종 후 이상반응이 발생하면 예방접종과의 관련성을 심의하여 진료비를 보상하는 「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있습니다.
- BCG(피내용) 예방접종 후 이상반응이 발생하여 진료를 받은 경우 예방접종피해 국가보상 신청(진료비 중 본인부담금 30만원 이상일 경우에 한함)이 가능하며, 보상신청 방법 등 자세한 사항은 관할지역 보건소로 문의하시기 바랍니다.

★ '예방접종도우미' 앱 다운 받으시고 스마트한 예방접종 관리하세요

- 주요기능: 예방접종 내역 확인 및 다음 접종일정 알림서비스



안드로이드 용



아이폰 용

질병관리본부

(363-951) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 200
질병관리본부 예방접종관리과
Tel, 043) 719-6848~52 / Fax, 043) 719-6859

질병관리본부 <http://www.cdc.go.kr>
예방접종도우미사이트 <http://nip.cdc.go.kr>

결핵(BCG) 예방접종 안내

결핵예방을 위한 BCG 예방접종
잊지 말고 꼭 받으세요!

