

## Q&A

### 1 SFTS 바이러스는 어떻게 감염되니까?

농작업(밭일, 나물채취 등) 및 야외활동 시 SFTS 바이러스를 보유하고 있는 진드기에 물려 감염이 되는 것으로 알려져 있습니다.

### 2 SFTS에 걸리면 어떤 증상이 나타나요?

고열, 소화기증상(식욕저하, 구토, 설사, 복통)이 주증상입니다. 이와 함께 두통, 근육통, 혈소판 감소, 출혈, 다발성장기부전 등이 동반될 수 있습니다.

### 3 진드기에 물리면 무조건 감염되나요?

국내에 서식하는 작은소피참진드기 중 극히 일부만 SFTS 바이러스를 가지고 있기 때문에 진드기에 물린다고 해도 대부분의 경우에는 SFTS에 걸리지 않습니다. 하지만 진드기에 물린 뒤 고열과 구토, 설사와 같은 증상이 나타나면 즉시 병원에 가서 진료를 받아야 합니다.

### 4 환자와 접촉 시 주의사항이 있습니까?

공기 등으로 전염되지 않기 때문에 별도의 환자 격리는 하지 않습니다. 다만, 중국과 우리나라에서 감염환자의 혈액과 체액에 직접 노출되어 감염된 사례가 있어, 의료진의 경우 환자의 혈액·체액과 직접적으로 접촉 할 시에 표준주의지침을 준수 하고 환자 접촉 시 주의가 필요합니다.

## 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)

SFTS 예방의 최선은  
[ 진드기에 물리지 않는 것 ]


예방수칙을 준수하는 건강한 야외활동을 합니다.  
중증열성혈소판감소증후군에 대한 안내를 원하는 경우,  
가까운 보건소로 문의하여 주시기 바랍니다.

### 질병관리본부 SFTS 관련부서

- ▶ 감염병감시과(예방관리 및 역학조사)  
☎ 043)719-7169, 7183
- ▶ 신경계바이러스과(SFTS 진단)  
☎ 043)719-8494, 8492
- ▶ 질병매개곤충과(진드기 확인)  
☎ 043)719-8564, 8562

# 중증열성혈소판 감소증후군 SFTS

<http://www.cdc.go.kr>  
<http://is.cdc.go.kr>



보건복지부  
질병관리본부